

ફૂલે રીમ-ઝીમ (ફૂલે KAC 94) જીરાની ખેતી પધ્ધતિ

ખાસિયતો	બીજનો વહેલો અને જુસ્સાદાર ઉગાવો, પાકવાના દિવસો: 105-110, છોડનો રંગ ઘેરો લીલો ગુચ્છાદાર, અન્ય જાત કરતાં સુકારા સામે વધુ રોગપ્રતિકારક શક્તિ તેમ જ વધુ ઉત્પાદન અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળો સુગંધિત દાણો.
જમીન અને આબોહવા	જીરાના પાકને ખાસ કરીને સારા નિતારવાળી રેતાળ, ગોરાડુ તેમજ મધ્યમ કાળી જમીન વધુ અનુકૂળ આવે છે. ઉપરાંત, આ પાકને ઠંડુ અને સૂકુ હવામાન વધુ માફક આવે છે.
વાવેતર સમય	નવેમ્બરના પ્રથમ પખવાડિયામાં જ્યારે ઠંડીની શરૂઆત થાય અને દિવસનું ઉષ્ણતામાન 30 °C થી 32 °C ની આસપાસ થાય ત્યારે કરવું જોઈએ.
વાવેતર અંતર અને બીજનો દર	મોટાભાગે ખેડૂતો ચાસમાં વાવણી કરવાને બદલે પૂંખીને વાવેતર કરે છે, જેને કારણે બિયારણ એકસરખા પ્રમાણમાં જમીનમાં પડતું નથી અને ભેળવાતું નથી. જેથી જીડનું વાવેતર હારમાં 30 સે.મી. ના અંતરે બીજનો દર હેક્ટર 8 થી 10 કિ.ગ્રા. રાખીને કરવું હિતાવહ છે.
ખાતર વ્યવસ્થાપન	ફોસ્ફરસયુક્ત ખાતરોનો બધો જ જથ્થો વાવણી સમયે પાયાના ખાતર તરીકે 4 થી 6 સેમી. બીજની નીચે ચાસમાં આપવાથી કાર્યક્ષમતા વધતા પાકનું ઉત્પાદન વધે છે. જીડના પાકમાં હેક્ટરે 15 કિલો નાઈટ્રોજન અને 15 કિલો ફોસ્ફરસ તત્વ જમીન તૈયાર કરતી વખતે આપવા. આ માટે 33 કિલો ડી.એ.પી. અને 20 કિલો યુરીયા ખાતર આપવું. બાકી રહેલો 15 કિલો નાઈટ્રોજન પૂર્તિ ખાતર તરીકે વાવણી બાદ 30 દિવસે આપવો. આ માટે 33 કિલો યુરીયા ખાતર આપવું.
પિયત વ્યવસ્થાપન	પિયત એ જીડ પાકનું જોખમી પાસું છે માટે જમીનની પ્રત અને વાતાવરણને ધ્યાને રાખી પિયત વ્યવસ્થા અપનાવવી જરૂરી છે. જીડના પાકમાં પ્રથમ પિયત વાવણી બાદ તુરત જ આપવું. જીડનો ઉગાવો 11 થી 12 દિવસે થતો હોવાથી સારા ઉગાવા માટે બીજું પિયત જમીનની પ્રત પ્રમાણે 8 થી 10 દિવસે સમયસર આપવું. ત્રીજું પિયત નિંદામણ કર્યા બાદ 30 દિવસે આપવું અને ચોથું પિયત 50 દિવસે આપવું.
નિંદામણ અને આંતર ખેડ	જીરાના પાકને 45 દિવસ સુધી નિંદામુક્ત રાખવો ખાસ જરૂરી છે. જ્યાં ખેત મજૂરો સહેલાઈથી, સસ્તા દરે મળતા હોય ત્યાં વાવણી બાદ 25-30 દિવસે અને બીજું નિંદામણ જરૂરીયાત મુજબ 40 દિવસે કરવું. પેન્ડીમીથેલીન 1.0 કિ.ગ્રા. સક્રિયતત્વ પ્રમાણે પ્રતિ હેક્ટરે જીડની વાવણી પછી પ્રથમ પિયત પહેલાં અથવા પિયત પછી ભેજયુક્ત જમીનમાં બે થી ત્રણ દિવસે એકસરખો છંટકાવ કરવો.

જીરુંમાં રોગ નિયંત્રણ

1. કાળિયો અથવા ચરમી

લક્ષણો	રોગ પાકની 30 થી 35 દિવસની અવસ્થાએ દેખાય. શરૂઆતમાં પાન પર કથ્થાઈ રંગના ટપકા પડે. ધીરે ધીરે ટપકાનું કદ વધતા આખા પાન કથ્થાઈ રંગના બને. રોગની ઉગ્રતા વધતા ડાળી અને થડ પર બદામીથી કાળા રંગનાં ધાબા જોવા મળે. ધાબા પડે ત્યાંથી ડાળીઓ નમી પડે અને છેલ્લે આખો છોડ સુકાઈ જાય. નાના છોડમાં રોગ લાગે તો ફુલ બેસતા નથી. ફુલ અવસ્થાએ રોગ લાગે તો દાણા બેસતા નથી અને બેસે તો ચીમળાયેલા હલકા અને કાળા રંગના જોવા મળે.
નિયંત્રણ	- જીરાનો પાક એક જગ્યાએ દર વર્ષે ન લેવો, વાવેતર નવેમ્બર માસમાં ઠંડી ઋતુમાં કરવું. - કચારા નાના રાખવા, પિયત હલકું આપવું, પછાટે પાણી ભરાવાં ના દેવું, નાઈટ્રોજનયુક્ત ખાતરનો વધુ ઉપયોગ ન કરવો, રોગિષ્ટ છોડનો ઉપાડી નાશ કરવો અને જીરાનું ઘાટુ વાવેતર ન કરવું. - વાવણી પહેલાં બીજને મેન્કોઝેબ અથવા થાયરમ પૈકી એક ફૂગનાશક દવાનો એક કિલો બીયારણ દીઠ 3 ગ્રામ પ્રમાણે પટ આપવો. - પાક 35-40 દિવસનો થાય એટલે મેન્કોઝેબ (35 ગ્રામ/10 લીટર) અથવા ડાયફેનકોનાઝોલ 0.025 ટકા (10 મીલી/10 લીટર) દવાનું દ્રાવણ છોડ ઉપર ધૂમાડા સ્વરૂપે પડે અને બધાજ છોડ પૂરેપૂરા ભીંજાય એ રીતે છાંટવું જોઈએ. 10 દિવસના અંતરે ત્રણ છંટકાવ કરવા.

2. સુકારો

લક્ષણો	આ રોગ જમીનજન્ય ફુગથી થાય છે. આ રોગ લાગવાથી તંદુરસ્ત છોડના પાન અને ડાળીઓ એકાએક નમી પડે છે. સામાન્ય રીતે 25-30 દિવસનો છોડ થાય ત્યારે આ રોગ દેખાય છે. રોગનો ચેપ લાગેલ છોડ ત્યારબાદ સૂકાઈ જાય છે. રોગની શરૂઆત ખેતરમાં ફૂંડીઓમાં જોવા મળે છે. જે ધીમે ધીમે વધારે વિસ્તારમાં પ્રસરે છે. રોગિષ્ટ છોડમાં દાણા બેસતા નથી. થોડા દાણા બેસેલ હોય તેનો વિકાસ થતો નથી. તેથી દાણા ચીમળાયેલા વજનમાં હલકા, ઉતરતી ગુણવત્તાવાળા હોય છે.
નિયંત્રણ	ઉનાળે ઉંડી ખેડ કરવી, દર વર્ષે એકની એક જમીનમાં જીરુંનો પાક ન લેવો, ગળતિયા છાણિયા ખાતરનો સારા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવો. મેન્કોઝેબ કે થાયરમની 3 ગ્રામ/કિ.ગ્રા. બીજ પ્રમાણે બીજ માવજત આપવી તથા સુકારો લાગેલ છોડનો ઉપાડીને નાશ કરવો.

3. ભૂકીછારો

લક્ષણો	આ રોગ પાકમાં ફુલ અવસ્થાએ જોવા મળે. શરૂઆતમાં છોડના નીચેના પાન અને થડ પર સફેદ ડાઘા પડે. સમય જતા ફુગની વૃદ્ધિ છોડના જમીન ઉપરના બધા જ
--------	---

	ભાગો પર જોવા મળે. પરિણામે છોડ પર સફેદ પાવડર છાંટેલ હોય તેવું દેખાય. પાછળથી રાખોડીયા રંગમાં ફેરવાય. રોગ લાગેલ છોડનો વિકાસ અટકે. દાણા બેસતા નથી. બેસે તો સફેદ રંગનાં અને અપુરતા વિકાસવાળા હોય. પરિણામે વજન અને ગુણવત્તા ઘટે.
નિયંત્રણ	સંરક્ષણાત્મક પગલા તરીકે પાક 45 દિવસનો થાય કે રોગની શરૂઆત થાય કે તુરત જ દ્રાવ્ય ગંધક 0.2% (30 ગ્રામ/10 લિટર) અથવા હેકઝાકોનેઝોલ 0.005% (10 મિ.લી. /10 લિટર) અથવા મેટીરામ 55 + પાયરાકલોસ્ટ્રોબીન 5 W.G. (30 ગ્રામ/10 લિટર) ના દ્રાવણના 2 થી 3 છંટકાવ વારાફરતી કરવા.
જીરુંમાં જીવાત નિયંત્રણ	
જીરુંમાં મુખ્યત્વે મોલોમશી, ગ્રીપ્સ અને લાલ કચીરી જેવી જીવાતો જોવા મળે છે. આ જીવાતો છોડના કોઈપણ ભાગમાંથી રસ ચૂસીને નુકશાન કરે છે.	
નિયંત્રણ	- જીરુંના પાકની સમયસર વાવણી કરવી. - જ્યારે મોલોનો ઉપદ્રવ શરૂઆતની અવસ્થાએ હોય ત્યારે મોલો સહિતના પાકનાં ભાગોને તોડીને નાશ કરવો. - મોલોમશી/ગ્રીપ્સના નિયંત્રણ માટે 10 લીટર પાણીમાં 10 મિ.લી. ડાયમીથીઓટ અથવા 3.5 મિ.લી. ઈમીડાકલોપ્રીડ અથવા 20 મિ.લી. કાર્બોસેફ્ઝાન મિશ્ર કરી 10-15 દિવસના અંતરે બે છંટકાવ કરવા. - નાઈટ્રોજનયુક્ત ખાતરનો વધુ પડતો ઉપયોગ ટાળવાથી તેમજ સેન્દ્રિય ખાતરો જેવા કે લીમડાનો ખોળ, દિવેલાનો ખોળ વાપરવાથી ચુસિયા પ્રકારી જીવાતનો ઉપદ્રવ ઘટાડી શકાય. - ચુસિયા જીવાતો જેવી કે મોલોમશીના પરિક્ષણ માટે પીળા ચીકણા 10 પિંજર /હેક્ટર પ્રમાણે ગોઠવવા. - થાયામેથોક્ઝામ 70 W.S. દવા 4.2 ગ્રામ/કિ.ગ્રા. બીજ અને ઈમીડાકલોપ્રીડ 70 W.S. દવા 10 ગ્રામ/કિ.ગ્રા. બીજદીઠ પટ આપીને વાવણી કરવાથી મોલોનું પાકની શરૂઆતની અવસ્થાએ નિયંત્રણ મળે છે. લાલ કચીરીના અસરકારક નિયંત્રણ માટે ફેનાઝાકવીન (10 મીલી/10 લી.) અથવા પ્રોપગાઈટ (10 મીલી/10 લી.) પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.

