

GW 513 ઘઉંની ખેતી પધ્ધતિ

GW 513 ઘઉંની ખેતી પધ્ધતિ				
ખાસિયતો	પાકવાના દિવસો: 105-117, છોડની ઊંચાઈ: 2.5-3 ફૂટ, મજબૂત થડ હોવાથી ઢળવાની સંભાવના ઓછી , ખાવામાં સ્વાદિષ્ઠ અને રોટલી માટે શ્રેષ્ઠ અને ગેરુ સામે અત્યંત પ્રતિરોધક જાત			
જમીન અને જમીનની તૈયારી	ઘઉંના પાકને કાળીથી મધ્યમ કાળી, ગોરાડુ, કાંપાળ, રાતી, કાંકરીયાળી, સારા નિતારવાળી જમીન વધારે અનુકૂળ આવે છે. જમીનને દાંતી-રાપ કરીને વાવેતર માટે તૈયાર કરવી. ઘઉં માટે વધુ પડતી ઉંડી ખેડ કરવી નહીં, કારણ કે વધારે ઉંડી પાંહને કારણે ઘઉં પાછલી અવસ્થાએ ઢળી જવાની શક્યતા રહે છે. ચોમાસુ પાકની કાપણી પછી ટ્રેક્ટરની દાંતી બે વાર અને રાંપ એક વાર ચલાવી આગલા પાકના જડીયા તથા મૂળીયા દૂર કરી, સમાર મારી, જમીન વાવણી માટે તૈયાર કરવી.			
વાવેતર સમય	10 નવેમ્બર થી 25 નવેમ્બર			
વાવેતર અંતર	20-22.5 સે.મી. (8 થી 9 ઇંચ)			
બીજદર	100-120 કિલો/હેક્ટર			
બીજ-માવજત	પાકને જમીનજન્ય અને બીજજન્ય રોગોથી બચાવવા એક કિલો બીજ દીઠ 2 ગ્રામ થાઈરમ અથવા કેપ્ટાન દવાનો પટ આપીને વાવેતર કરવું. ખાતરના કાર્યક્ષમ ઉપયોગ માટે બીજને અઝોટોબેક્ટર @ 30 ગ્રામ + PSB @ 30 ગ્રામ / કિલો બીજ પ્રમાણે પટ આપી વાવવા.			
ખાતર વ્યવસ્થાપન	આશરે એક હેક્ટર 10 થી 12 ટન સાડ કોહવાયેલ ગળતીયુ ખાતર જમીન પર પાથરીને જમીનમાં બરાબર ભેળવી દેવું.			
	ઘઉંના પાકને સામાન્ય રીતે 120:60:60 કિગ્રા નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટાશ તત્વ/હેક્ટર જરૂરિયાત રહે છે.			
	ડીએપી (કિલો/હેક્ટર)	યુરિયા (કિલો/હેક્ટર)	પોટાશ (કિલો/હેક્ટર)	અવસ્થા
	130	15	100	પાયાનું ખાતર
	-	130	-	મુકુટ મૂળ અવસ્થા
-	65	-	ફૂટ અવસ્થા	
સૂચના : છોડની ઉપર અવસ્થાએ ખાતર આપવાથી છોડનો વિકાસ સારો થાય છે.				

નિંદાણ વ્યવસ્થાપન	ઘઉંના પાકમાં હાથથી નિંદામણ નિયંત્રણ કરવું હિતાવહ છે. આમ છતાં, મજુરોની અછત હોય તો ઘઉંની વાવણી બાદ બીજના સ્ફુરણ પહેલા (પ્રિ-ઈમરજન્સ છંટકાવ) પેન્ડીમિથાલીન દવા 10 લીટર પાણીમાં 55 મીલી પ્રમાણે ઓગાળી છંટકાવ કરવો. ઉભા પાકમાં પહોળા પાનવાળા નિંદામણનું પ્રમાણ વધારે હોય તો વાવેતર બાદ 30 થી 35 દિવસે 24 ગ્રામ નિંદામણનાશક દવા 2,4-D (સોડીયમ સોલ્ટ) W.S. અથવા 0.4 ગ્રામ મેટસલ્ફ્યુરાન પ્રતિ 10 લીટર પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવો.
પિયત વ્યવસ્થાપન	સામાન્ય રીતે ઘઉંને 10-12 પિયતની જરૂરિયાત રહે છે. ઘઉંની મુકુટ મૂળ, ફૂટ, ગાલ અવસ્થા, ડુંડી, દુધિયા દાણા અને પોંક અવસ્થાએ પાણીની ખેંચ પડવી જોઈએ નહીં. તેમજ છેલ્લા બે પિયત આપવાના સમયે પવનની ઝડપ ઓછી હોય તે ખાસ ધ્યાન રાખવું. જેથી ઘઉં ઢળતા અટકાવી શકાય.
ઘઉંમાં જીવાત નિયંત્રણ	
ઉધઈ	ક્લોરપાયરીફોસ (20%) દવા 450 મીલી પ્રમાણે 5 લીટર પાણીમાં મેળવીને તે દ્રાવણથી 125 કિગ્રા બીજને મોણ (માવજત) આપી એક રાત રહેવા દઈને બીજા દિવસે વાવવું. ઉભા પાકમાં ક્લોરપાયરીફોસ (20%) દવા 2.4 લિ. ને 5 લિ. પાણીમાં ઓગાળીને 100 કિગ્રા રેતીમાં ભેળવીને પાકમાં પૂંખીને હળવું પિયત આપવું. ઘઉંના નિંદાણ અવસ્થાએ ક્લોરપાયરીફોસ (20%) દવા 1.25 લિ./હેક્ટર પ્રમાણે 40-50 દિવસે પિયતના પાણીમાં ટીપા પદ્ધતિથી આપવી.
ગાલમારાની ઇયળ અને લીલી ઇયળ	ફેનીટ્રોથીયાન (50 EC) 20 મીલી પાણીમાં મિશ્રણ કરી દવાના બે છંટકાવ વાવણી પછી 45 થી 55 દિવસે કરવા. જો ઉપદ્રવ વધુ હોય તો સ્પીનોસેડ 45 SC @ 7.5 મીલી/15 લિ. પાણી અથવા ફિપ્રોનિલ 5 SC @ 7.5 મીલી/15 લિ. પાણી અથવા થાયોડીકાર્બ 75 WP @ 40 ગ્રામ/15 લિ. પાણી મુજબ છંટકાવ કરવો.
ઘઉંમાં રોગ નિયંત્રણ	
ગેરૂ, પાનનો સુકારો અને કાળી ટપકી	અસરકારક નિયંત્રણ માટે બાઇટરલેટોન 25 WP @ 30 ગ્રામ/15 લિટર પાણી અથવા ક્લોરોથેલોનીલ @ 30 મીલી/ 15 લિ. પાણી અથવા ટેબૂકોનાઝોલ 25.9% EC @ 30 મીલી/ 15 લિ. પાણી અથવા કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મેન્કોઝેબ 63% WP @ 30 ગ્રામ/ 15 લિ. પાણી મુજબ છાંટો.
કાપણી	જ્યારે છોડ બદામી કલરના થઈ જાય ત્યારે કાપણી જમીન થી 2-3 ઇંચ ઉપરથી કરવી. દાણા ખરવાનું નુકસાન ઘટાડવા જ્યારે ઘઉં પીળા પડી જાય અને થડ સુકાઈ જાય ત્યારે વહેલી સવારે કે મોડી સાંજે કાપણી કરવી.

